

Nuestra misión

Fomentar una cultura de innovación.
Liderar soluciones de atención médica.
Simplificar la atención compleja.



www.soleohealth.com

Administración de medicamentos por infusión por gravedad



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR INFUSIÓN POR GRAVEDAD

El farmacéutico de Soleo Health mezcló su medicamento previamente y lo colocó en una bolsa plástica. Almacene todos los medicamentos según las indicaciones. Algunos medicamentos necesitan refrigerarse para mantener su estabilidad.

- Revise la etiqueta de cada bolsa para ver que incluya su nombre, el nombre del medicamento, el volumen y la fecha de vencimiento del medicamento.
- Cada dosis debe estar libre de grietas, escapes, objetos flotantes y decoloración. Si tiene alguna duda, llame al farmacéutico de Soleo Health.
- Saque una dosis del refrigerador una (1) hora antes de la infusión para permitir que el medicamento alcance la temperatura ambiente. **NUNCA CALIENTE NI META AL MICROONDAS** el medicamento.
- Use cada bolsa solo una vez.
- Cambie la sonda IV según las indicaciones del enfermero.
- La sonda se usa durante 24 horas completas, independientemente del número de dosis. Si tiene varias dosis pendientes en un período de 24 horas, le darán tapas para colocar en el extremo de la sonda entre dosis.

ESCANEE EL CÓDIGO QR ABAJO PARA VER EL VIDEO



PASO 1

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Séquelas con una toalla de papel. Use la toalla para cerrar el grifo.

PASO 2

Limpie el lugar de trabajo y reúna los suministros necesarios.

1. BOLSA IV



2. JUEGO DE SONDAS IV



3. TOALLITAS CON ALCOHOL



4. JERINGAS DE ENJUAGUE




5. TAPAS PARA SONDAS
(si se proporcionan)



6. TAPAS ANTIMICROBIANAS
(si se proporcionan)





PASO 3

Examine el lugar de la IV en busca de:

ENROJECIMIENTO

HINCHAZÓN

SENSIBILIDAD

CALOR

SI HAY ALGÚN CAMBIO, NO INFUNDA Y COMUNÍQUESE CON EL ENFERMERO.

PASO 4

Revise su medicamento.

¿ESTÁ VENCIDO?

¿ESTÁ SU NOMBRE EN LA ETIQUETA?

¿ES EL MEDICAMENTO ADECUADO?

¿HAY MOTAS VISIBLES O PARTÍCULAS FLOTANTES EN EL MEDICAMENTO?





PASO 5

Saque la sonda del envoltorio y cierre la pinza de rodillo.



PASO 9

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.

PASO 6

Quite las cubiertas protectoras del puerto de administración IV de la bolsa y de la punta de la sonda intravenosa. Inserte la punta en el puerto de administración, asegurándose de no tocar la punta.



PASO 10

Quite la tapa del enjuague de solución salina. Sosteniendo la jeringa en posición vertical, tire suavemente del émbolo hacia atrás para aflojarlo y luego empujelo hacia arriba para sacar el aire de la jeringa. Conecte la jeringa con solución salina al adaptador del catéter empujándola y girándola firmemente. Enjuague suave, pero firmemente el catéter con ____mL de solución salina.



PASO 7

Cuelgue la bolsa en el soporte para infusión intravenosa y presione la cámara de goteo de la sonda hasta llenarla hasta la mitad.



PASO 11

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.

PASO 8

Abra la pinza de rodillo para llenar la sonda con líquido. Deje que la sonda se llene completamente. Cuando el líquido llegue al final de la sonda, cierre la pinza de rodillo.



PASO 12

Quite la tapa protectora del extremo de la sonda y conéctelo a la sonda del conector sin aguja.



PASO 13

Abra la pinza y ajústela para liberar la cantidad de gotas por minuto según las instrucciones del enfermero para iniciar la infusión. Si está usando un regulador de flujo, ajuste el dial a la velocidad indicada por su enfermero, luego abra la pinza para iniciar la infusión.



PASO 14

Cuando finalice la infusión, cierre la pinza.



PASO 15

Desconecte la sonda del conector sin aguja.



PASO 16

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 17

Enjuague el catéter IV con solución salina y limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol como lo hizo antes. Si así se lo indicaron, continúe con un enjuague de heparin usando unidades/mL ____ mL. Llame al enfermero si no puede enjuagar el catéter o encuentra resistencia.



PASO 18

Ponga una tapa antimicrobiana al conector sin aguja, si le dieron una.



PASO 19

Si está administrando dos o más dosis por día, coloque una tapa en el extremo de la sonda, si le dieron una. Mantenga la punta en la bolsa del medicamento completado hasta que esté listo para agregar la siguiente dosis. Si hay aire en la sonda de la dosis anterior, cebe la sonda según las instrucciones.



PASO 20

Después de administrar la última dosis correspondiente a un período de 24 horas, descarte la bolsa del medicamento y la sonda usados en el contenedor para desechos correspondiente.

